



PICADURAS Y MORDEDURAS DE ANIMALES

MEDIDAS HIGIÉNICAS Y SANITARIAS EN CASO DE PICADURAS O MORDEDURAS DE ANIMALES

TIPO DE ANIMAL		MEDIDAS
FAUNA MARINA	MEDUSA (contacto)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aplicación local de calor, amoniac o vinagre y agua salina. ✓ Analgesia, antihistamínicos y/o corticoides, según necesidad.
	ANÉMONA (contacto)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evitar manipular la zona para evitar aumentar el área afectada. ✓ Corticoides tópicos, analgésicos y antihistamínicos.
	ERIZO DE MAR (picadura): las púas se fraccionan al clavarse.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Extraer la púa (previamente se mete el pie en remojo con agua salada) y empapar la zona con compresas con vinagre o ✓ Aplicar fórmula magistral durante 12 horas con Trementina y AAS. ✓ Profilaxis antitetánica. ✓ Diprosalic® (pomada tópica). Vendaje oclusivo. Revisar por Atención Primaria.
	PEZ ARAÑA (diferencia con un objeto punzante que cede progresivamente)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Desinfectar la herida y sumergir en agua muy caliente. ✓ Analgesia, antihistamínicos. ✓ Profilaxis antibiótica y antitetánica. ✓ Si precisa, Gluconato Cálcico 20% EV diluida.
	MORDEDURA DE PULPO Y CRUSTÁCEO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tratamiento sintomático.
	MORDEDURA DE MORENA: escalofríos, taquiapnea y espasmos musculares.	
ARÁCNIDOS E INSECTOS	ARAÑA: dolor, urticaria con edema que puede evolucionar necrosándose, adenopatía, cefalea, vómitos, dolor abdominal y espasmos musculares.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Desinfección local. ✓ Analgesia, corticoides, antihistamínicos. ✓ Profilaxis antitetánica.
	ABEJA Y AVISPA: edema, lesión con ampolla purpúrea, prurito, tos e incluso anafilaxia. Reacciones tardías: urticaria, artralgias y adenopatías.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Calor local. ✓ Antihistamínicos, corticoides. ✓ Tratamiento de shock anafiláctico, si precisa.
	SANGUIJUELA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aplicar vinagre, sal, aguarrás, calor o alcohol para desprenderla.
	GARRAPATA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cubrir con parafina, vaselina, alcohol o aceite y dejar actuar unos 20 min. ✓ Retirar con una pinza sin dientes y retirar la cabeza si queda dentro. ✓ Si manipulación: Doxiciclina 100 mg EV. ✓ Observación durante 4 semanas por posible transmisión de enfermedades.
	PROCESIONARIA: lesiones papulosas con prurito, cefalea, fiebre y rinitis.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Retirar los pelos con esparadrupo. ✓ Corticoide tópico, antihistamínico.
	PULGA Y CHINCHÉ: pápulas en fila y urticaria.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Compresas frías. ✓ Pomada corticoide, antihistamínico.
	ESCORPIÓN: dolor intenso, sudoración, taquicardia, hipotensión arterial y midriasis.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lavado de herida y frío local. ✓ Analgesia (no mórficos), antihistamínicos, tratamiento de anafilaxia.



PICADURAS Y MORDEDURAS DE ANIMALES



MAMÍFEROS	<p>HUMANA, GATO, PERRO Y MURCIÉLAGO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Limpieza con agua jabonosa, y antiséptico tópico. ✓ Desbridamiento, en caso de más de 8 horas de evolución o herida sucia. ✓ En las de gatos y roedores sólo suturar las heridas de cara y cuero cabelludo. En las de perro puede valorarse según el tiempo de evolución y el riesgo de infección. ✓ Profilaxis antitetánica y/o antirrábica según vacunación del animal (las de rata, en principio no precisan vacuna antirrabia por lo que la derivación para declarar la mordedura es al centro de salud de zona). ✓ Analgesia. ✓ Antibiótico en caso de mordedura humana, gato o roedor en la que haya un retraso en la atención o complicaciones.
	<p>RATA: zoonosis.</p>	
SERPIENTES	<p>SERPIENTE Víbora: dos puntos de inoculación de veneno. Culebra: hilera de dientes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valoración ABCDE. ✓ Reposo. ✓ Succión de la herida si no es en zona de mucosa. ✓ Extracción de cuerpo extraño y desinfección. ✓ Aplicación de hielo en la zona para disminuir la absorción de veneno. ✓ Inmovilización del miembro (torniquete si el tiempo de traslado es superior a 1 hora). ✓ Profilaxis tetánica. ✓ Tratamiento de anafilaxia, si precisa.
ANFIBIOS	<p>ANFIBIO (contacto): mucositis, síntomas colinérgicos por contacto bucal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lavar con abundante agua. ✓ Atropina, si síntomas colinérgicos (náuseas, vómitos, dolor abdominal, hipotensión arterial o bradicardia) ✓ Benzodiacepinas si convulsión.