

Nom i
l·linatges

Grup

Data

--

INSTRUCCIONS GENERALS

- L'examen consta de **50 preguntes tipus test (4 opcions)**.
- **Només hi ha una resposta correcta** per pregunta tipus test.
- Les respostes incorrectes penalitzen:
cada **3 respostes incorrectes resten 1 resposta correcta**.
- Les **preguntes no contestades no puntuen ni penalitzen**.
- El **tipus test** val el **100%** de la nota final
- Per **poder aprovar** l'examen és necessari obtenir **25 preguntes correctes** i una nota **final igual o superior a 5/10**.

1. La RCP té com a objectiu principal:
 - a) Restablir definitivament el batec cardíac
 - b) Substituir temporalment respiració i circulació fins a assistència avançada
 - c) Evitar qualsevol lesió cerebral encara que no hi hagi circulació
 - d) Administrar descàrregues elèctriques immediatament
2. Quin dels següents NO forma part de l'algoritme inicial del SVB adult davant una víctima inconscient?:
 - a) Comprovar resposta
 - b) Obrir via aèria
 - c) Comprovar pols carotídi durant 30 segons
 - d) Valorar respiració
3. En el SVB adult, la interrupció de les compressions toràciques:
 - a) No té límit si es canvia de reanimador
 - b) No ha de superar els 10 segons
 - c) Pot durar fins a 30 segons
 - d) Només s'interromp per ventilar
4. Si el DESA indica "descàrrega recomanada" i ningú toca la víctima, el pas immediat és:
 - a) Reiniciar compressions
 - b) Prémer el botó de descàrrega
 - c) Comprovar pols
 - d) Administrar 2 ventilacions

5. Una víctima adulta inconscient respira amb normalitat. L'actuació correcta és:
 - a) Iniciar compresions
 - b) Col·locar en PLS
 - c) Aplicar DESA
 - d) Realitzar 5 ventilacions
6. En el SVB pediàtric, la PCR és habitualment d'origen:
 - a) Arrítmic primari
 - b) Asfíctic
 - c) Traumàtic
 - d) Metabòlic
7. En lactants, les compresions toràciques es realitzen:
 - a) Amb una mà al centre del tòrax
 - b) Amb dues mans superposades
 - c) Amb dos dits al centre del tòrax
 - d) Amb el puny tancat
8. Durant l'anàlisi del DESA:
 - a) Es continuen compresions suaus
 - b) Es realitzen ventilacions
 - c) Ningú ha de tocar la víctima
 - d) Es comprova pols
9. En OVACE lleu en adult conscient, la primera actuació és:
 - a) Maniobra de Heimlich immediata
 - b) Animar a tossir amb força
 - c) Iniciar RCP
 - d) Aplicar cops toràcics
10. En OVACE greu amb víctima inconscient adulta, s'ha de:
 - a) Col·locar en PLS
 - b) Realitzar Heimlich
 - c) Iniciar RCP
 - d) Esperar emergències
11. En SVB pediàtric, si després d'1 minut de RCP la víctima no millora:
 - a) Finalitzar maniobres
 - b) Trucar al 112
 - c) Aplicar DESA obligatòriament
 - d) Col·locar en PLS

12. Totes són correctes sobre compressions toràciques EXCEPTE:
- a) Permetre reexpansió completa
 - b) Ritme 100–120 cpm
 - c) Centre del tòrax
 - d) Ritme inferior a 80 cpm per evitar lesions
13. Quina NO és falsa:
- a) El SVB només a l'hospital
 - b) El SVA el realitza el personal sanitari
 - c) El DESA substitueix Emergències
 - d) El pediàtric mai es ventila
14. La combinació correcta és:
- a) SVB – personal sanitari – hospital
 - b) SVA – personal sanitari – tècniques avançades
 - c) SVB – quiròfan – anestèsia
 - d) SVA – testimoni – compressions
15. Si el tòrax no s'expandeix en ventilació durant RCP adulta:
- a) Suspendre RCP
 - b) Continuar només compressions
 - c) Aplicar Heimlich
 - d) Col·locar en PLS
16. En pediàtric inconscient amb sospita d'OVACE, la seqüència inclou:
- a) 30:2 immediat
 - b) 15:2 durant 1 minut
 - c) Només ventilacions
 - d) DESA immediat
17. Quin ordre és correcte en SVB adult?:
- a) Alerta – avaluació – RCP – DESA
 - b) Avaluació – alerta – RCP – DESA
 - c) RCP – alerta – avaluació – DESA
 - d) DESA – RCP – alerta
18. En majors de 8 anys, el DESA:
- a) No es pot utilitzar
 - b) Només amb autorització mèdica
 - c) Es pot utilitzar com en adults
 - d) Només amb pegats pediàtrics

19. Si la víctima mostra signes de recuperació durant RCP:
- a) Continuar compressions
 - b) Col·locar en PLS i vigilar
 - c) Aplicar nova descàrrega
 - d) Finalitzar sense vigilància
20. El ritme de compressions correcte és:
- a) 60–80 cpm
 - b) 80–100 cpm
 - c) 100–120 cpm
 - d) 130–150 cpm
21. En SVB pediàtric, el cicle de compressions és:
- a) 30:2 sempre
 - b) 15:2
 - c) 5:1
 - d) 10:2
22. Si l'obstrucció lleu evoluciona a greu en adult conscient:
- a) PLS
 - b) Heimlich
 - c) RCP directa
 - d) Esperar
23. Totes són criteris per deixar la RCP EXCEPTE:
- a) Recuperació
 - b) Arribada emergències
 - c) Esgotament
 - d) Després de 5 minuts exactes
24. El DESA analitza:
- a) Saturació
 - b) Ritme cardíac
 - c) Pressió arterial
 - d) Nivell consciència
25. En lactants no es recomana:
- a) Ventilacions
 - b) Compressió amb dos dits
 - c) Ús del DESA
 - d) Obrir via aèria

26. En SVB adult, les ventilacions són:
- a) 5 inicials
 - b) 2 després de 30 compressions
 - c) 1 cada 10 compressions
 - d) Només si hi ha pols
27. La cadena de supervivència implica:
- a) Actuacions independents
 - b) Seqüència coordinada
 - c) Només intervenció hospitalària
 - d) Medicació precoç
28. En OVACE pediàtric conscient greu en nen (no lactant):
- a) Heimlich
 - b) Només cops escapulars
 - c) RCP
 - d) PLS
29. Si el DESA no indica descàrrega:
- a) Retirar el dispositiu
 - b) Reprendre RCP immediatament
 - c) Esperar 2 minuts
 - d) Comprovar pols 1 minut
30. En SVB pediàtric inicialment s'apliquen:
- a) 2 ventilacions
 - b) 5 ventilacions
 - c) 30 compressions
 - d) DESA
31. En compressions toràciques eficaces:
- a) No es deixa expandir el tòrax
 - b) Es permet reexpansió completa
 - c) Ritme lent per evitar lesions
 - d) Compressió superficial
32. En OVACE lactant conscient greu:
- a) Heimlich clàssic
 - b) Cops escapulars i compressions
 - c) RCP directa
 - d) PLS

33. Indica quines són correctes: I. El ritme de compresions ha de ser 100-120 cpm. II. La interrupció no ha de superar el 10 segons. III. Les ventilacions són opcionals sempre.
- a) Només I
 - b) II i III
 - c) I i II
 - d) I, II i III
34. En SVB adult, la víctima ha d'estar:
- a) En decúbit lateral
 - b) Asseguda
 - c) En decúbit supí
 - d) De peu
35. Si la víctima respon inicialment:
- a) Iniciar RCP
 - b) Deixar en la posició que es troba i vigilar
 - c) DESA immediat
 - d) Heimlich
36. La maniobra front-mentó serveix per:
- a) Activar circulació
 - b) Obrir via aèria
 - c) Estimular consciència
 - d) Evitar descàrrega
37. En SVB pediàtric, si respira normalment:
- a) RCP
 - b) PLS
 - c) Heimlich
 - d) DESA
38. Després d'una descàrrega, s'ha de:
- a) Comprovar pols 30 segons
 - b) Reprendre compresions immediatament
 - c) Col·locar en PLS
 - d) Esperar indicacions
39. En nenes i nens fins a 8 anys, el DESA requereix:
- a) No utilitzar-lo
 - b) Pegats pediàtrics i software específic
 - c) Descàrrega doble
 - d) Intubació prèvia

40. En SVB pediàtric, si hi ha signes de vida però no respira normalment:
- a) PLS
 - b) Ventilacions
 - c) RCP 30:2
 - d) DESA
41. En OVACE adult conscient greu, la seqüència és:
- a) Heimlich exclusiu
 - b) Cops escapulars i Heimlich
 - c) RCP
 - d) Ventilacions
42. El canvi de reanimador es recomana:
- a) Cada 30 segons
 - b) Cada 5 minuts
 - c) Cada 2 minuts
 - d) Només si arriba emergències
43. En SVB adult, si no respira normalment:
- a) PLS
 - b) 112 i iniciar RCP
 - c) Heimlich
 - d) Ventilacions exclusives
44. En lactants, les compressions es fan:
- a) Amb taló de mà
 - b) Amb dos dits
 - c) Amb puny
 - d) Amb colze
45. L'objectiu del suport vital és:
- a) Substituir funcions vitals fins assistència completa
 - b) Curar la causa
 - c) Evitar hospitalització
 - d) Administrar medicació
46. En OVACE inconscient pediàtric, si no hi ha resposta:
- a) PLS
 - b) 15:2 durant 1 minut
 - c) Heimlich
 - d) Esperar

47. En SVB adult, el centre de compressió és:
- a) Costat esquerre
 - b) Abdomen
 - c) Centre del tòrax
 - d) Clavícula
48. Durant la RCP adulta, la relació correcta és:
- a) 15:2
 - b) 100-120:0
 - c) 5:2
 - d) 10:2
49. No respon → no respira → 112 → 100-120:0 → DESA → descàrrega → :
- a) Finalitzar
 - b) Reprendre compresions immediatament
 - c) PLS
 - d) Esperar
50. El suport vital bàsic (SVB) NO es caracteritza per:
- a) Aplicar-se abans de l'arribada dels professionals
 - b) Realitzar-se en el lloc on es troba la víctima
 - c) Ser realitzat exclusivament per personal sanitari
 - d) Incloure RCP